

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

28 juli 2015

Actueel WG van het middel Score 250 EC, 11453 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Maximaal aantal liter middel per ha	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bieten	Bladvlekkenziekte ¹ , Ramularia ²	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus	0,8 L/ha per teeltcyclus	21	28
Winterkoolzaad	Wortelhals- en stengelaantasting ³	0,25 L/ha	0,25 L/ha	2 keer in het najaar	0,5 L/ha in het najaar	14	-
		0,5 L/ha	0,5 L/ha			-	
		0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 keer in het voorjaar	0,5 L/ha in het voorjaar	180 na de najaarstoepassing	-
Zomerkoolzaad	Wortelhals- en stengelaantasting ³	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	-
Appel	Schurft ⁴	0,015% (15 mL per 100 liter water)	0,225 L/ha	3 per 12 maanden	0,675 L/ha per 12 maanden	10	28
Peer	Schurft ⁵	0,015% (15 mL per 100 liter water)	0,225 L/ha	3 per 12 maanden	0,675 L/ha per 12 maanden	10	28

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Maximaal aantal liter middel per ha	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wortelen (onbedekte teelt)	Loofverbruining ⁶	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per teeltcyclus	1,5 L/ha per teeltcyclus	14	14
Asperge (onbedekte teelt)	Stengelsterfte ⁷ , Grauwe schimmel ⁸	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per teeltcyclus	1,5 L/ha per teeltcyclus	14	-

¹ Bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*)

² Ramularia (*Ramularia beticola*)

³ Wortelhals- en stengelaantasting (*Leptosphaeria maculans (Phoma lingam)*)

⁴ Schurft (*Venturia inaequalis*)

⁵ Schurft (*Venturia pirina*)

⁶ Loofverbruining (*Alternaria dauci*)

⁷ Stengelsterfte (*Stemphylium* spp.)

⁸ Grauwe schimmel (*Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea*)

Het gebruik in de teelt van lijnzaad, vezelvlas, bladkoolachtigen, pastinaak, rode biet, knolselderij, bleekselderij, bladselderij en peterselie is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.

Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Lijnzaad	Echte meeldauw ⁹	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Vezelvlas	Echte meeldauw ⁹	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Ringvlekkenziekte ¹⁰ , Bladvlekkenziekte ¹¹	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per 12 maanden	14	14
Chinese kool (bedekte teelt)	Ringvlekkenziekte ¹⁰ , Bladvlekkenziekte ¹¹	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	14	14
Pastinaak (onbedekte teelt)	Loofverbruining ⁶	0,5 L/ha	0,5 L/ha	3 per teeltcyclus	14	14
Rode biet	Bladvlekkenziekte ¹ , Ramularia ² , Roest ¹³ , Meeldauw ¹⁴	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus	28	21
Knolselderij	Bladvlekkenziekte ¹²	0,4 L/ha	0,4 L/ha	3 per teeltcyclus	14	21
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekte ¹²	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus	14	21
Peterselie	Bladvlekkenziekte ¹²	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	14	14
Bladselderij	Bladvlekkenziekte ¹²	0,4 L/ha	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	14	14

¹ Bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*)

² Ramularia (*Ramularia beticola*)

⁶ Loofverbruining (*Alternaria dauci*)

⁹ Echte meeldauw (*Oidium lini*)

¹⁰ Ringvlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*)

¹¹ Bladvlekkenziekte (*Alternaria* spp.)

¹² Bladvlekkenziekte (*Septoria apiicola*)

¹³ Roest (*Uromyces betae*)

¹⁴ Meeldauw (*Erysiphe betae*)

Toepassingsvoorwaarden

Toepassing in de onbedekte teelt van asperge en bladkoolachtigen niet vóór BBCH 50 (gesloten gewas).

Toepassing in de onbedekte teelt van wortelen, pastinaak, rode biet, knolselderij, bleekselderij, peterselie en bladselderij niet vóór BBCH 40 (ontwikkeling van de te oogsten vegetatieve delen van de plant).

De toepassing in de bedekte teelt van Chinese kool is alleen toegestaan vanaf 1 maart tot en met 31 oktober.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van appel en peer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan vanaf 1 mei en indien gebruik gemaakt wordt van één van de volgende combinaties:

- er gespoten wordt met een tunnelspuit en een maximale dosering van 0,04125 kg actieve stof per ha, of
- er gebruik wordt gemaakt van een windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, of
- Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel en ventilatorstand "laag" met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing in de onbedekte teelt van bieten, winterkoolzaad, zomerkoolzaad, lijnzaad, vezelvlas, rode biet, snijselderij en peterselie uitsluitend toegestaan met gebruik van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing in de onbedekte teelt van bladkoolachtigen, knolselderij, bleekselderij, wortelen, pastinaak en asperges uitsluitend toegestaan met gebruik van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof difenoconazool. Difenoconazool behoort tot de triazole fungiciden. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.