

Apron XL, 12280 N

3 augustus 2018

Ingangsdatum 1 januari 2019

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Peulvruchten	Pythium <sup>1</sup> Valse meeldauw <sup>2</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad
Veldboon	Pythium <sup>1</sup> Valse meeldauw <sup>2</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad
Spinazie	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
	Wolf <sup>3</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad
Boon met peul	Pythium <sup>1</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad
Erwt met peul	Pythium <sup>1</sup> Valse meeldauw <sup>2</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad
Erwt zonder peul	Pythium <sup>1</sup> Valse meeldauw <sup>2</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad
Sluitkoolachtigen	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
Bloemkoolachtigen	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
Chinese kool	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
Koolrabi	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
Wortelen	Pythium <sup>1</sup>	1 ml middel per kg zaaizaad

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Uien	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
Zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden	afhankelijk van het land van bestemming	afhankelijk van het land van bestemming

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Pythium (*Pythium* spp.)

<sup>2</sup> Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

<sup>3</sup> Wolf (*Peronospora farinosa*)

Het gebruik in de teelt van veldsla, radijs, rode biet, kruidenteelt vers of gedroogd en bloemisterijgewassen (incl. zonnebloem) is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing
Veldsla	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
	Valse meeldauw <sup>2</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad
Radijs	Valse meeldauw <sup>3</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad
Rode biet	Valse meeldauw <sup>4</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad
Kruidenteelt vers of gedroogd	Valse meeldauw <sup>5</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad
Bloemisterijgewassen	Pythium <sup>1</sup>	0,5 ml middel per kg zaaizaad
	Valse meeldauw <sup>5</sup>	2 ml middel per kg zaaizaad

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing
Zonnebloem	Valse meeldauw <sup>6</sup>	3 ml middel per kg zaaizaad

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Pythium (*Pythium* spp.)

<sup>2</sup> Valse meeldauw (*Peronospora valerianellae*)

<sup>3</sup> Valse meeldauw (*Peronospora parasitica*/ *Peronospora parasitica f. sp. raphani*)

<sup>4</sup> Valse meeldauw (*Peronospora farinosa f.sp. betae*)

<sup>5</sup> Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

<sup>6</sup> Valse meeldauw (*Plasmopara halstedii*).

#### **Overige toepassingsvoorwaarden**

Bij de teelt van spinazie moet, ná zaai, de grond in de periode van december tot en met februari afgedekt worden.

Voor zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden geldt het volgende:

- Het middel mag uitsluitend op zaaizaden worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
- Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; de voorschriften van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.
- Voor de toepassing op zaaizaad bestemd voor export is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metalaxyl-M. Metalaxyl-M behoort tot de acylalanines. De FRAC code is 4. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.