

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van het middel Ridomil Gold ,
toelatingsnummer 12281 N.

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van:

- a. bloembollen
- b. bolbloemen
- c. bloemisterijgewassen onder glas
- d. containerteelt van boomkwekerijgewassen

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Ridomil Gold is een systemisch fungicide met een preventieve en curatieve werking.

Resistentie management

In bepaalde gevallen is het mogelijk, dat schimmelstammen of – soorten minder gevoelig zijn voor metalaxyl-M. Het gevolg is minder goede resultaten of zelfs opbrengstverliezen. Het optreden van verminderde gevoeligheid, tot zelfs volledige resistentie van schimmelstammen, is niet te voorspellen.

Vanwege de kans op resistentie hebben de preventieve toepassing de voorkeur boven de curatieve toepassingen.

Onnodige blootstelling van niet-doelwit arthropoden dient voorkomen te worden bij de toepassing in de teelt van chrysanten (geïntegreerde teelt), potplanten en containerteelt van boomkwekerijgewassen.

Toepassingen

Bloembollenteelt van crocus, hyacint en iris, ter bestrijding van wortelrot (*Pythium*).

Bij het planten een veurbehandeling uitvoeren.

Dosering: krokus : 0,75 l/ha.
hyacint, iris : 1 l/ha.

Als een zeer zware *Pythium*-aantasting wordt verwacht, dienen de vermelde doseringen met 0,25 liter per ha te worden verhoogd.

Bolbloemeteelt van tulp, iris en lelie ter bestrijding van wortelrot (*Pythium*).

Potgrondbehandeling bij kistenteelt.

Dosering: 2,5 ml per m³ potgrond.

Bloemisterijgewassen onder glas

Anjer, ter bestrijding van wortelrot (*Phytophthora* spp.)

In de teelt van anjer kan Ridomil Gold worden toegepast door het middel met behulp van de concentratiemeter en regenleiding bij de wortels te brengen. Toepassen zodra de eerste aantasting zichtbaar wordt. Na de toepassing dient gedurende 15 minuten nageregend worden.

Dosering: 18,75 ml per 100 m² .

Zo nodig de behandeling na 3 weken herhalen met 0,09375 ml per m².

Chrysant, ter bestrijding van wortelrot (*Pythium*)

In de teelt van chrysanten, met name geplozen chrysanten, kan Ridomil Gold zowel preventief als curatief worden toegepast ter bestrijding van wortelrot veroorzaakt door *Pythium*.

Preventieve toepassing

Ridomil Gold kort voor het planten over de grond spuiten en 10 cm inwerken b.v. met een frees.

Dosering: 18,75 ml per 100 m² te verspuiten in 6 tot 10 liter water.

Curatieve toepassing

Ridomil Gold via de regenleiding over het gewas spuiten. Na de toepassing dient gedurende 15 minuten nageregend te worden zodat het middel bij de wortels komt.

Dosering: 4- 6,25 ml per 100 m² toe te passen in minimaal 30 liter water per 100 m².

Zo nodig de bespuiting na 2 tot 3 weken herhalen.

Gerbera op kunstmatig substraat: ter bestrijding van voetrot (*Phytophthora cryptogea*)

Ridomil Gold kan zowel preventief als curatief worden toegepast. Zodra de eerste symptomen zichtbaar worden, aangieten.

Dosering: 125 ml per ha toepassen via het druppel irrigatiesysteem.

De behandeling zonodig herhalen.

Potplanten, ter bestrijding van rot veroorzaakt door *Pythium* en *Phytophthora*.

Potgrondbehandeling

De benodigde hoeveelheid Ridomil Gold wordt, kort voor het gebruik van de grond, over de te behandelen grond gespoten en zo gelijkmatig mogelijk door de grond gemengd.

Dosering: 12,5-18,75 ml per m³ potgrond, te verspuiten in 5-10 liter water.

De dosering is afhankelijk van het gehalte aan organische stof in de potgrond.

Gietbehandeling na stekken, verspenen of oppotten

De toepassing kan preventief of curatief worden uitgevoerd. Het middel bij voorkeur gieten op vochtige grond. Na toepassen direct inregenen, zodat het middel in de wortelzone kan dringen en op het blad achtergebleven Ridomil Gold wordt afgespoeld.

Preventieve toepassing

Dosering: 6,25 – 9,375 ml in 100 liter water.

Van deze oplossing een hoeveelheid per plant op de pot gieten, die overeenkomt met 10% van het potvolume. Bij gewassen die gevoelig zijn voor rot de hoogste dosering aanhouden.

Curatieve toepassing

Dosering: 9,375- 12,5 ml in 100 liter water.

Van deze oplossing een hoeveelheid per plant op de pot gieten, die overeenkomt met 10% van het potvolume. Bij een zware aantasting de hoogste dosering aanhouden.

Containerteelt van boomkwekerijgewassen, ter bestrijding van wortelrot (*Phytophthora cinnamomi*)

Voor het oppotten van het plantmateriaal de potgrond behandelen met Ridomil Gold.

Dosering: 12,5 ml per m³ potgrond.

Zonodig kan Ridomil Gold tijdens de teelt aangegoten worden om het gewas vrij van aantasting te houden.

De potgrond dient vochtig te zijn op het moment van toepassen. Uitspoeling naar de ondergrond dient voorkomen te worden door de containers te plaatsen op aaneengesloten waterdicht folie of door het opvangen van uitstromend water.

Dosering: 0,00625% (6,25 ml per 100 liter water).

Per liter potgrond 100 ml oplossing gebruiken.

Waarschuwing.

Als nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden, om de gewasverdraagzaamheid van het middel te testen.

De toepassing in Viburnum en Prunussoorten wordt ontraden.

Wageningen, 18 juli 2003

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)