

Fubol Gold

W.6

15 december 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Consumptie-aardappel	Aardappelziekte ¹	2,3 kg/ha	2,3 kg/ha	3 per teeltcyclus	7	7
Zetmeelaardappel	Aardappelziekte ¹	2,3 kg/ha	2,3 kg/ha	3 per teeltcyclus	7	7
Sla; <i>Lactuca</i> spp (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	2,3 kg/ha	2,3 kg/ha	3 per 12 maanden	7	28
Zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³	2 kg/ha	2 kg/ha	3 per teeltcyclus	10 voor bolvorming (tot BBCH 40), 7 vanaf bolvorming (vanaf BBCH 40)	28
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³	2 kg/ha	2 kg/ha	3 per teeltcyclus	10 voor bolvorming (tot BBCH 40), 7 vanaf bolvorming (vanaf BBCH 40)	28

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Zilverui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³	2 kg/ha	2 kg/ha	3 per teeltcyclus	10 voor bolvorming (tot BBCH 40), 7 vanaf bolvorming (vanaf BBCH 40)	28
Picklers (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³	2 kg/ha	2 kg/ha	3 per teeltcyclus	10 voor bolvorming (tot BBCH 40), 7 vanaf bolvorming (vanaf BBCH 40)	28
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³	2 kg/ha	2 kg/ha	3 per teeltcyclus	10 voor bolvorming (tot BBCH 40), 7 vanaf bolvorming (vanaf BBCH 40)	28
<i>Helichrysum</i> (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,3% (300 gram middel per 100 liter water)	2,25 kg/ha	3 per 12 maanden	14 voor vorming bloemknoppen (BBCH 50) 7 vanaf vorming bloemknoppen (BBCH 50)	-
Boomkwekerijgewassen, met uitzondering van laanbomen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ^{4,5}	0,3% (300 gram middel per 100 liter water)	2,25 kg/ha	3 per 12 maanden	14 voor vorming bloemknoppen (BBCH 50) 7 vanaf vorming bloemknoppen (BBCH 50)	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

² Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

³ Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora sparsa* / *Pseudoperonospora sparsa*)

⁵ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

Het gebruik in de teelt van druif en aromatische kruidgewassen is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁵	2,25 kg/ha	2,25 kg/ha	3 per 12 maanden	10	56
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw	2,3 kg/ha	2,3 kg/ha	3 per 12 maanden	7	28

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁵*Plasmopara viticola*

Overige toepassingsvoorwaarden

Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan in de teelt van sla, boomkwekerijgewassen, *Helichrysum*, druif en aromatische kruidgewassen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in boomkwekerijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan door middel van neerwaartse bespuiting.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van druif op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de onderstaande maatregelen:

- Tunnelspuit
- Windhaag op de rand van het rijpad en eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
- Venturidop en eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
- Wanner spuit met reflectiescherm en Venturidop (Lechler ID 90-015C).

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metalaxyl-M en mancozeb. Metalaxyl-M behoort tot de acylalanines (PA-fungiciden). De Frac code is 4. Mancozeb behoort tot de dithiocarbamaten fungiciden. De Frac code is M3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.