

10 december 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Mais	Eenjarige onkruiden	0,5 – 0,75 L/ha**	2 per teeltcyclus	1,5 L/ha	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Toepassen als splittoepassing: de eerste toepassing in een vroeg stadium na opkomst van het gewas. Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid.

Overige toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen geldt voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van terbuthylazine een totale dosering van maximaal 0,85 kg werkzame stof per hectare per jaar, waarbij opnieuw toepassen op hetzelfde perceel op zijn vroegst mag plaatsvinden in het 3^e kalenderjaar na de vorige toepassing.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing van dit middel bij een dosering van meer dan 0,5L/ha uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Bij het mislukken van een maisteelt kunnen in hetzelfde jaar vooralsnog alleen mais of raaigras worden ingezaaid na een oppervlakkige grondbewerking.

Na een kerende grondbewerking kunnen in het voorjaar volgend op de toepassing van Calaris alle gewassen worden gezaaid. Echter, onder ongunstige omstandigheden zoals bij een slechte bodemstructuur en/of een droge koude winter, wordt afgeraden bieten, erwten, bonen, koolgewassen en groente (o.a. spinazie en sla) te telen in het eerste jaar nadat Calaris is toegepast.

Onder ongunstige omstandigheden (o.a. een lage temperatuur) en een trage groei van het gewas kan er een tijdelijke geel/wit verkleuring van de mais optreden. Dit verdwijnt na enkele weken en heeft geen effect op de opbrengst.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen mesotrione en terbuthylazine. Mesotrione behoort tot de groep triketonen. De HRAC code is F2. Terbuthylazine behoort tot de groep triazinen. De HRAC code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen