

19 februari 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| Aardappelen | Gewasbehandeling | Aardappelziekte ¹ | 0,6 l/ha | 6 per teeltcyclus | 7 | 7 |
| Sla; <i>Lactuca</i> spp. (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ² | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | 21 | 7 |
| Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ² | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |
| Andijvie (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ² | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | 21 | 7 |
| Andijvie (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ² | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |
| Spinazie-achtigen (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ³ | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | 21 | 7 |
| Witlof (trekteelt) | Bespuiting wortelkragen in trekbak | Penrot ⁶ | 0,5 ml/m ² | 1 per teeltcyclus | - | 21 |
| Rucola (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁴ | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | 21 | 7 |
| Rucola (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁴ | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |
| Erwt zonder peul | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁷ | 0,6 l/ha | 2 per 12 maanden | 21 | 14 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----|----|
| Spruitkool | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁵ | 0,6 l/ha | 2 per 12 maanden | 21 | 14 |
| Bloemkool (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁵ | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus | 21 | 14 |
| Broccoli (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁵ | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus | 21 | 14 |

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

² Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

³ Valse meeldauw (*Peronospora farinosa*)

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora parasitica*)

⁵ Valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)

⁶ Penrot (*Phytophthora cryptogea*)

⁷ Valse meeldauw (*Peronospora viciae*)

Het gebruik in de teelt van witlof, veldsla, kiemgroenten, tomaat en aromatische kruidgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Witlof (trekteelt) | Behandeling wortelen via voedingsoplossing | Penrot ⁸ | 1,5 ml/100L | 1,5 ml/100L | 1 per teeltcyclus | - | 21 |
| Veldsla (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁹ | 0,6 l/ha | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | 21 | 7 |
| Veldsla (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ⁹ | 0,6 l/ha | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------|--|----|---|
| Kiemgroenten (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ¹⁰ | 0,6 l/ha | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |
| Tomaat (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Phytophthora ¹¹ | 0,05% (50 ml per 100 l water) | 0,6 l/ha | 4 per teeltcyclus | 7 | 3 |
| Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ¹⁰ | 0,6 l/ha | 0,6 l/ha | 2 per teeltcyclus | 21 | 7 |
| Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt) | Gewasbehandeling | Valse meeldauw ¹⁰ | 0,6 l/ha | 0,6 l/ha | 1 per teeltcyclus 4 per 12 maanden | - | 7 |

⁸ Penrot (*Phytophthora cryptogea*)

⁹ Valse meeldauw (*Peronospora valerianellae*)

¹⁰ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

¹¹ Phytophthora (*Phytophthora infestans*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen het middel toepassen vanaf het stadium waarbij eerste basale zijscheut zichtbaar is (>5cm) (BBCH 21).

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de onbedekte teelt van sla, andijvie, spinazie-achtigen en rucola voor een sluitend spuitschema het middel afwisselen met andere toegelaten middelen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof mandipropamid. Mandipropamid behoort tot de mandelamiden. De FRAC code is 40. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen