

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Wakil XL, 13296 N

W.2

1 september 2017

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing
Erwt zonder peul	Kiemschimmels ¹ Anthracnose ² Valse meeldauw ³ Fusarium ⁴	200 gram per 100 kg zaad

¹ Kiemschimmels (*Pythium* spp.)

² Anthracnose, lichte vlekkenziekte (*Ascochyta* spp.)

³ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

⁴ Fusarium (*Fusarium* spp.)

Het gebruik in de teelt van vlinderbloemige voedergewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing
Vlinderbloemige voedergewassen voor zaaizaadproductie	Kiemschimmels ¹ Anthracnose ² Valse meeldauw ³ Fusarium ⁴	200 gram per 100 kg zaad

¹ Kiemschimmels (*Pythium* spp.)

² Anthracnose, lichte vlekkenziekte (*Ascochyta* spp.)

³ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

⁴ Fusarium (*Fusarium* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

Het volgende moet worden vermeld op de zakken met behandeld zaad:

Bij het zaaien

Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt.

Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorste zaden verwijderen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metalaxyl-m, cymoxanil en fludioxonil. Metalaxyl-m behoort tot de fenylamide fungiciden. De FRAC code is 4. Cymoxanil behoort tot de cyano-acetamide-oxime fungiciden. De FRAC code is 27. Fludioxonil behoort tot de fenylpyrrole fungiciden. De FRAC code is 12. Bij dit product bestaat er geringe kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.