

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Safir

W.4

9 maart 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Peer (onbedekte teelt)	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Aardbei (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	3
Sla; <i>Lactuca</i> spp.	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Andijvie	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Veldsla	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Rucola	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Boon met peul	Grauwe schimmel ²	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
(onbedekte teelt)	Rattenkeutelziekte ³					
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14
Aromatische kruidgewassen	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bewaarziekten (*Botrytis cinerea*/*Botryotinia fuckeliana*, *Penicillium expansum*, *Monilia fructigena*, *Phlyctema vagabunda* (= *Gloeosporium*), *Nectria galligena*)

² Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

³ Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In appel en peer het middel toepassen in maximaal 1125 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van sla (*Lactuca* spp.), andijvie, veldsla en rucola niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat het middel in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot Phenylpyrrolen. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.