

## Regulex 10SG, 14817 N W.1

28 oktober 2016

Ingangsdatum 1 januari 2018

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Appel	Verminderen vruchtverruwing	0,005-0,01% (5-10 gram per 100 liter water)	150 g/ha	4	7
Peer	Verbeteren vruchtzetting	0,015% (15 gram per 100 liter water)	180 g/ha	1	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

### Overige toepassingsvoorwaarden

Bij appel een eerste toepassing uitvoeren tussen volle bloei (BBCH 65) en het einde van de bloei (BBCH 69).

Bij peer een eerste toepassing uitvoeren kort voor het in bloei komen (BBCH 57-59). Bij de inzet na nachtvorst is het van belang Regulex 10 SG bij voorkeur binnen 1 dag, maar binnen een periode van 2 dagen na de nachtvorst toe te passen om een maximale werking op vruchtzetting te krijgen.

Overschrijding van de maximale dosering kan de bloemknopvorming nadelig beïnvloeden.