

---

Actueel WG van het middel Elatus Era, 15483 N

1 december 2017

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Bruine roest <sup>1</sup> Gele roest <sup>2</sup> Bladvlekkenziekte <sup>3</sup> Aarfusarium <sup>4</sup>	1 l/ha	1	42
Wintergerst	Netvlekkenziekte <sup>5</sup> Bladvlekkenziekte <sup>6</sup> Ramularia <sup>7</sup> Dwergroest <sup>8</sup>	1 l/ha	1	
Winterrogge	Bruine roest <sup>1</sup> Bladvlekkenziekte <sup>6</sup>	1 l/ha	1	42
Triticale	Bruine roest <sup>1</sup> Bladvlekkenziekte <sup>3</sup>	1 l/ha	1	42
Spelt	Bruine roest <sup>1</sup> Gele roest <sup>2</sup> Bladvlekkenziekte <sup>3</sup>	1 l/ha	1	42
Zomertarwe	Bruine roest <sup>1</sup> Gele roest <sup>2</sup> Bladvlekkenziekte <sup>3</sup> Aarfusarium <sup>4</sup>	1 l/ha	1	42
Zomergerst	Netvlekkenziekte <sup>5</sup> Bladvlekkenziekte <sup>6</sup>	1 l/ha	1	

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
	Ramularia <sup>7</sup> Dwergroest <sup>8</sup>			
Zomerrogge	Bruine roest <sup>1</sup> Bladvlekkenziekte <sup>6</sup>	1 l/ha	1	42

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

<sup>1</sup> Bruine roest (*Puccinia recondita*)

<sup>2</sup> Gele roest (*Puccinia striiformis*)

<sup>3</sup> Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*)

<sup>4</sup> Aarfusarium (*Fusarium spp*)

<sup>5</sup> Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

<sup>6</sup> Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

<sup>7</sup> Ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

<sup>8</sup> Dwergroest (*Puccinia hordei*)

#### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, triticale en spelt Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan het einde van de bloei (BBCH 69). In de teelt van winter- en zomergerst Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan einde van de aarvorming (BBCH 59).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in granen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen benzovindiflupyr en prothioconazool. Benzovindiflupyr behoort tot de pyrazole-carboximiden, de FRAC code is 7. Prothioconazool behoort tot de triazolen, de FRAC code is 3. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.