Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus**	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Wintertarwe	Bruine roest[1] Gele roest[2] Bladvlekkenziekte[3] Aarfusarium[4]	1 l/ha	1	42
Wintergerst	Netvlekkenziekte[5] Bladvlekkenziekte[6] Ramularia[7] Dwergroest[8]	1 l/ha	1	-
Winterrogge	Bruine roest[1] Bladvlekkenziekte[6]	1 l/ha	1	42
Triticale	Bruine roest[1] Bladvlekkenziekte[3]	1 l/ha	1	42
Spelt	Bruine roest[1] Gele roest[2] Bladvlekkenziekte[3]	1 l/ha	1	42
Zomertarwe	Bruine roest[1] Gele roest[2] Bladvlekkenziekte[3] Aarfusarium[4]	1 l/ha	1	42
Zomergerst	Netvlekkenziekte[5] Bladvlekkenziekte[6] Ramularia[7]	1 l/ha	1	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus**	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
	Dwergroest[8]			
Zomerrogge	Bruine roest[1] Bladvlekkenziekte[6]	1 l/ha	1	42
Peulvruchten m.u.v. sojaboon	Roest[9]	0,66 l/ha	1	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Het maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus geldt per gewas, niet per te behandelen schimmel.

[1] Bruine roest *(Puccinia recondita),*
[2] Gele roest *(Puccinia striiformis),*
[3] Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici, Septoria nodorum),*
[4] Aarfusarium *(Fusarium spp),*
[5] Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*),
[6] Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis),*
[7] Ramularia *(Ramularia collo-cygni),*
[8] Dwergroest (*Puccinia hordei*),
[9] Roest (*Uromyces spp)*

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Doseringmiddel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus*	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten m.u.v. sojaboon	Botrytis[10] Bladvlekkenziekte[11]	0,66 l/ha	1	
Vlas	Echte meeldauw[12] Bladvlekkenziekte[13]	0,66 l/ha	1	

* Het maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus geldt per gewas, niet per te behandelen schimmel

[10] Botrytis (*Botrytis spp*),

[11] Bladvlekkenziekte (*Ascochyta spp*),
[12] Echte meeldauw (G*olovinomyces orontii*).
[13] Bladvlekkenziekte (*Mycosphaerella linicola*),

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, triticale en spelt toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan het einde van de bloei (BBCH 69).

In de teelt van winter- en zomergerst toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan einde van de aarvorming (BBCH 59).

In de teelt van peulvruchten toepassen vanaf dat eerste bloemknoppen (buiten de bladeren) zichtbaar zijn (BBCH 51) totdat 20% van de peulen de typische lengte hebben bereikt (BBCH 72).

In de teelt van vlas toepassen vanaf 20 cm hoogte (BBCH 32) tot aan einde bloei (BBCH 69).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 100 centimeter.

<u>Resistentiemanagement</u>
Let op: Dit middel bevat de werkzame stoffen benzovindiflupyr en prothioconazool. Benzovindiflupyr behoort tot de pyrazole-carboximiden, de FRAC code is 7. Prothioconazool behoort tot de triazolinthiones, de FRAC code is 3. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. Wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.