

Moddus Evo, 15629 N

6 juli 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	Voorkomen van legering	0,15 L/ha	2 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	7
		0,3 L/ha	1 per teeltcyclus		
Wintergerst	Voorkomen van legering	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	7
		0,6 L/ha	1 per teeltcyclus		
Winterrogge	Voorkomen van legering	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	7
		0,5 L/ha	1 per teeltcyclus		
Triticale	Voorkomen van legering	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	7
		0,5 L/ha	1 per teeltcyclus		
Zomertarwe	Voorkomen van legering	0,15 L/ha	2 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	7
		0,3 L/ha	1 per teeltcyclus		
Zomergerst	Voorkomen van legering	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	7
		0,6 L/ha	1 per teeltcyclus		
Zomerrogge	Voorkomen van legering	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	7
		0,5 L/ha	1 per teeltcyclus		
Haver	Voorkomen van legering	0,2 L/ha	2 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	7
		0,3-0,4 L/ha	1 per teeltcyclus		
Graszaadteelt	Voorkomen van legering	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	7
		0,8 L/ha	1 per 12 maanden		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-200 liter water per hectare.

Hooi afkomstig vanuit graszaadteelt waar het middel toegepast is na BBCH33 (derde knoop zichtbaar) niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

In de teelt van wintertarwe, wintergerst, triticale, zomertarwe, zomergerst het middel uitsluitend toepassen tot BBCH33 (derde knoop tenminste twee centimeter boven tweede knoop).

In de teelt van winterrogge en zomerrogge het middel uitsluitend toepassen tot BBCH30 (begin stengelstrekking).

In de teelt van haver het middel uitsluitend toepassen tot BBCH32 (tweede knoop tenminste één centimeter boven eerste knoop).