

Priori, 16760 N

d.d. besluit 20 november 2024

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering * (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Maximaal aantal liter middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>1</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>2,3</sup> , Bruine roest <sup>4</sup> , Zwartschimmels <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35
Wintergerst	Gewasbehandeling	Dwergroest <sup>7</sup> , Netvlekkenziekte <sup>8</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35
Triticale	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>1</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>2,3</sup> , Bruine roest <sup>4</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35
Spelt	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>1</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>2,3</sup> , Bruine roest <sup>4</sup> , Gele roest <sup>6</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35
Zomertarwe	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>1</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>2,3</sup> , Bruine roest <sup>4</sup> ,	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering * (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Maximaal aantal liter middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
		Zwartschimmels <sup>5</sup> , Gele roest <sup>6</sup>					
Zomergerst	Gewasbehandeling	Dwergroest <sup>7</sup> , Netvlekkenziekte <sup>8</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde dosering.

<sup>1</sup>*Erysiphe graminis*,

<sup>2</sup>*Septoria tritici*,

<sup>3</sup>*Septoria nodurum*,

<sup>4</sup>*Puccinia recondita*,

<sup>5</sup>*Dematiaceae*,

<sup>6</sup>*Puccinia striiformis*,

<sup>7</sup>*Puccinia hordei*,

<sup>8</sup>*Pyrenophora teres*

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Maximaal aantal liter middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Winterrogge	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>9</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>10,11</sup> ,	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Maximaal aantal liter middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
		Bruine roest <sup>12</sup> , Gele roest <sup>13</sup>					
Zomerrogge	Gewasbehandeling	Meeldauw <sup>9</sup> , Bladvlekkenziekte <sup>10,11</sup> , Bruine roest <sup>12</sup> , Gele roest <sup>13</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35
Haver	Gewasbehandeling	Kroonroest <sup>14</sup>	1 L/ha	2	2 L/ha	14	35

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>9</sup>*Erysiphe graminis*,

<sup>10</sup>*Septoria tritici*,

<sup>11</sup>*Septoria nodurum*,

<sup>12</sup>*Puccinia recondita*,

<sup>13</sup>*Puccinia striiformis*,

<sup>14</sup>*Puccinia coronata*

### Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel kan in wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe en zomerrogge uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de stengelstrekking (BBCH 30) tot het einde van de bloei (BBCH 69).

Dit middel kan in wintergerst, zomergerst en haver uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de stengelstrekking (BBCH30) tot het einde van de aarvorming (BBCH 59).

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof azoxystrobin. Azoxystrobin behoort tot de strobilurinen. De FRAC code is 11. Bij dit product bestaat een kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.