

Orondis VIP 16944 N

2026-03-25

Naam middel: Orondis VIP

Aanvraagnummer: 20221133 NLTG

Aanvrager: Syngenta

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Sla	Valse meeldauw ¹	0,5 L/ha	2	7	10
Andijvie	Valse meeldauw ¹	0,5 L/ha	2	7	10
Veldsla	Valse meeldauw ¹	0,5 L/ha	2	7	10
Rucola	Valse meeldauw ¹	0,5 L/ha	2	7	10
Baby leaves	Valse meeldauw ¹	0,5 L/ha	2	7	10
Uien (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Papiervlekkenziekte ³	0,5 L/ha	2	7	14
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Papiervlekkenziekte ³	0,5 L/ha	2	7	14
Bosuien (onbedekte teelt)	Papiervlekkenziekte ³	0,5 L/ha	2	12	14
Knoflook (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Papiervlekkenziekte ³	0,5 L/ha	2	7	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Prei (onbedekte teelt)	Papiervlekkenziekte ³	0,5 L/ha	2	12	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

² Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

³ Papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*)

Het gebruik in de onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	2	7	10
Sluitkool (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁵	0,5 L/ha	2	7	20
Spruitkool (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁵	0,5 L/ha	2	7	20
Bloemkool (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁵	0,5 L/ha	2	7	20
Broccoli (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁵	0,5 L/ha	2	7	20

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Basilicum (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁶ Phytophthora ⁷	0,5 L/ha	2	7	10
Eetbare bloemen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁶ Phytophthora ⁷	0,5 L/ha	2	7	10
Munt (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁶ Phytophthora ⁷	0,5 L/ha	2	7	10
Citroenmelisse (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁶ Phytophthora ⁷	0,5 L/ha	2	7	10

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*)

⁵ Valse meeldauw (*Hyaloperonospora parasitica*)

⁶ Valse meeldauw (*Peronosclerospora sp.*)

⁷ Phytophthora (*Phytophthora sp.*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stoffen oxathiapiprolin en metalaxyl-M. Oxathiapiprolin behoort tot de chemische groep piperidiny l thiazole-isioxazoline (oxysterol binding protein homologue inhibitor (OSBPI)). De FRAC code is 49. Metalaxyl-M behoort tot de chemische groep van acylalanines (fenylamide). De FRAC code is 4. Bij dit product bestaat er risico op resistentieontwikkeling. Gebruik het middel preventief en wissel het af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Het aandeel van het middel in de totale gewasbescherming voor het gewas per 12 maanden mag niet groter zijn dan 33%. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.