

Actueel WG van het middel Bonzi, 9611 N

20 april 2018

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

W.2

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Potplanten (uitgezonderd Poinsettia) (bedekte teelt)	Groeiremming	0,03-0,4% (30-400 ml/100 l water)	4,8 L/ha	10	3
Poinsettia (bedekte teelt)	Groeiremming	0,03-0,125 % (30-125 ml/100 l water)	1,5 L/ha	10	3

### Toepassingsvoorwaarden

De toepassing moet worden uitgevoerd op een ondoordringbaar oppervlak (bv. beton, plastic folie).

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De actieve stof van Bonzi (paclobutrazol) heeft een sterk groeiregulerende werking, en kan zowel door het blad als door de wortels opgenomen worden. Restanten kunnen achter blijven (bijvoorbeeld bij teelten op beton), en ongewenste groeiremming veroorzaken in volgteelten. Ook behandelde planten die gecomposteerd worden, kunnen ongewenste groeiremming veroorzaken. Bij de toepassing dient men hiermee rekening te houden.

De te kiezen dosering en frequentie is niet eenvoudig vast te stellen. De effecten op de groei worden door een aantal variabele factoren beïnvloed, zoals: groeikracht van de variëteit, gevoeligheid van het gewas en de variëteit, temperatuur, tijd van het jaar, soort bedrijf en spuitfrequentie. Aanbevolen wordt om eerst op kleine schaal ervaring op te doen om op deze wijze de werking van deze groeiregulator in potplanten te leren kennen.