

25 maart 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Potplanten (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ⁴ **	0,01% (10 g/100 L water)	0,12 kg/ha	2 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	7
Snijbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ⁴ **	0,01% (10 g/100 L water)	0,25 kg/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 binnen een blok, 60 tussen 2 blokken
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ⁴ **	0,01% (10 g/100 L water)	0,12 kg/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 binnen een blok, 60 tussen 2 blokken
Vaste plantenteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ⁴ **	0,01% (10 g/100 L water)	0,10 kg/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 binnen een blok, 60 tussen 2 blokken

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Bij de bestrijding van trips 125 ml suikeroplossing per 100 L water toevoegen voor een goed bestrijdingsresultaat.

¹ Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)

² Florida mot (*Spodoptera exigua*)

³ Mineervlieg (*Liriomyza trifolii*)

⁴ Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Snijbloemen m.u.v. bol- en knolbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ^{4 **}	0,01% (10 g/100 L water)	0,1 kg/ha	1	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ^{4 **}	0,01% (10 g/100 L water)	0,1 kg/ha	1	-
Vaste plantenteelt (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ^{4 **}	0,01% (10 g/100 L water)	0,0875 kg/ha	1	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ^{4 **}	0,01% (10 g/100 L water)	0,15 kg/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 binnen een blok, 60 tussen 2 blokken
Veredeling en zaadteelt van snijbloemen (m.u.v. bol- en knolbloemen), boomkwekerijgewassen en vaste planten (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ^{1,2} Mineervlieg ³ Trips ^{4 **}	0,01% (10 g/100 L water)	0,125 kg/ha	1	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Bij de bestrijding van trips 125 ml suikeroplossing per 100 L water toevoegen voor een goed bestrijdingsresultaat.

¹ Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)

² Floridamot (*Spodoptera exigua*)

³ Mineervlieg (*Liriomyza trifolii*)

⁴ Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in grondgebonden, bedekte teelten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen in de kas actief naar voedsel zoeken, en mits de behandelde planten niet binnen 7 dagen na toepassing naar buiten worden verplaatst. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de diamides. De Irac code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.