

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pootaardappel	voor opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
Consumptieaardappel	voor opkomst of rond opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
Zetmeelaardappel	voor opkomst of rond opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
Wintergraan (m.u.v. kanariezaad)	voor opkomst	windhalm ⁶ duist ^{7 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
	na opkomst	windhalm ⁶				
Wortelen	na opkomst	vogelmuur ¹	3 L/ha	1	3 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
		melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	1,5 L/ha**	2		5
Knolselderij (onbedekte teelt)	na uitplanten	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
Uien (onbedekte teelt)	voor opkomst of na opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
			1,5 L/ha**	2		5
Sjalotten (onbedekte teelt)	voor opkomst of na opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
			1,5 L/ha**	2		5
Bosuien (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na opkomst	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-
			1,5 L/ha**	2		5
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Na uitplanten	vogelmuur ¹ melganzevoet ^{2 ***} zwaluwtong ^{3 ***} varkensgras ^{4 ***} zwarte nachtschade ^{5 ***}	3 L/ha	1	3 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Prei (onbedekte teelt)	Na uitplanten	vogelmuur ¹ melganzevoet ² *** zwaluwtong ³ *** varkensgras ⁴ *** zwarte nachtschade ⁵ ***	3 L/ha	1	3 L/ha	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** LDS-toepassing in combinatie met toegelaten middelen

*** De bestrijding kan onvoldoende zijn.

¹ vogelmuur (*Stellaria media*)

² melganzevoet (*Chenopodium album*)

³ zwaluwtong (*Fallopia convolvulus*)

⁴ varkensgras (*Polygonum aviculare*)

⁵ zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

⁶ windhalm (*Apera spica-venti*)

⁷ duist (*Alopecurus myosuroides*)

Het gebruik in de teelt van blauwmaanzaad en karwij is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine voor levensmiddelen en diervoeding, vezelgewassen, wortelpeterselie, pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, aromatische wortelgewassen is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van veldbonen (groenbemester en als voedergewas), tuinbonen, kidneybonen, aromatische kruiden, laanbomen, coniferen en kerstbomen, vruchtbomen en -struiken is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen

werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Lupine (voor levensmiddelen en diervoeding)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Kidneyboon (droog te oogsten)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Tuinboon (droog te oogsten)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Blauwmaanzaad	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	75
Karwij	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Vezelgewassen	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 – 3 L/ha ¹	1 per teeltcyclus	-
Veldboon (groenbemester)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldboon (voedergewas)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Wortelpeterselie	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Aromatische kruidgewassen, m.u.v. veldzuring (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aromatische wortelgewassen	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zonnebloem (snijbloemen, onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Tijdens vegetatieve rustperiode, tussen het gewas	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Tijdens vegetatieve rustperiode, tussen het gewas	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Tijdens vegetatieve rustperiode, tussen het gewas	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ 1,5 l/ha in combinatie met andere toegelaten middelen

Overige toepassingsvoorwaarden

Bijproducten van behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Het middel toepassen in 200 tot 300 liter water per ha.

Het middel uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

In de teelt van wintergraan het middel in het najaar toepassen.

Bij een na-opkomst toepassing het middel toepassen in een gewasstadium tot maximaal 'twee bladeren ontvouwen' (BBCH 12).

In de teelt van knolselderij en bleekselderij het middel 7 dagen na het planten toepassen.

In de teelt van prei het middel 7 tot 14 dagen na het planten toepassen.

In de teelt van laanbomen, coniferen en kerstbomen, en vruchtbomen en -struiken mag enkel in maart worden toegepast. In deze teelten het middel toepassen bij onkruidstadium tot maximaal 'twee bladeren ontvouwen' (BBCH 12).

Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de onbedekte teelt van laanbomen, coniferen en kerstbomen en vruchtbomen en – struiken, alleen worden toegepast indien er geen permanente grasstroken aanwezig zijn tussen de teelttrijen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van dit middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Let op: In winterrogge, triticale, wortelen, knolselderij, uien, sjalotten, bosuien, bleekselderij en prei kan enige fytotoxiciteit of groeivertraging optreden. In winterrogge kan dit leiden tot opbrengstderving.

Let op: Om mogelijke schade te voorkomen wordt de toepassing van dit middel afgeraden indien op de aangrenzende percelen sierteeltgewassen boven de grond staan.

Let op: Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft geen invloed op opbrengst en nateelt.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof prosulfocarb. Prosulfocarb behoort tot de thiocarbamaten. De HRAC code is 15. Bij dit product bestaat er risico op resistentieontwikkeling. Wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme of pas het middel toe in een tankmix met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.